

## Huidtesten bij kinderen

Deze informatiefolder geeft u informatie over huidtesten bij kinderen op de polikliniek Kindergeneeskunde. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De arts heeft met u een afspraak gemaakt voor een huidtest bij uw kind. Met deze huidtest kan een allergie (= overgevoeligheid) worden vastgesteld.

De test kan soms gecombineerd worden met een bloedtest. Sommige allergieën zijn eerder aan te tonen op de huid dan in het bloed.

### Hoe wordt een huidtest uitgevoerd

Er wordt een wat vloeistof op de huid gedruppeld. Bij de door de kinderartsen gebruikte testen wordt de vloeistof hierna met behulp van een naaldje in de huid gebracht.

De test wordt meestal op de binnenzijde van de linker- of rechteronderarm uitgevoerd.

Na 15 à 20 minuten kan de reactie worden afgelezen.

Er kan sprake zijn van een allergie als de reactie van de test positief is. De huid is dan rood en er is een kwaddel (= zwelling) rond het insteekgaatje ontstaan. In ieder geval is uw kind voor dit allergieën gevoelig geworden. Dit is niet direct hetzelfde als een allergie maar het kan wel passen bij een allergie.

Er zijn verschillende allergieën die via een huidtest herkenbaar zijn. De meest voorkomende testen worden hierna beschreven.

### Allergie voor penicilline

Wanneer er mogelijk sprake is van een allergische reactie op penicilline, wordt het volgende onderzoek gedaan:

- bloedonderzoek op antistoffen
- huidtesten zoals boven beschreven

### Allergie voor voedsel

Om een voedselallergie vast te stellen wordt er bijvoorbeeld een druppel koemelk, sojamelk, eiwit of eigeel op de huid aangebracht.

Blijkt de reactie positief te zijn, dan moet het dieet van uw kind in ieder geval tijdelijk worden aangepast en krijgt u een verwijzing voor de diëtiste.

### Allergie van de luchtwegen of bij constitutioneel eczeem

Alle kinderen met luchtwegklachten en of eczeem waar een allergie wordt vermoed, worden gecontroleerd op overgevoeligheid voor bepaalde (huis)dieren, huisstof, grassen, bomen of schimmels.

Voorafgaande aan het onderzoek moet uw kind een week van te voren stoppen met antihistaminica.

Uw kind krijgt een aantal prikjes op beide onderarmen, soms wel vijf per arm. Ieder prikje bevat een andere soort vloeistof om allergie voor een bepaalde stof te kunnen meten.

Als er sprake is van bijvoorbeeld een huisstofallergie kan de longverpleegkundige een keer bij u langskomen voor saneringsadviezen. De kinderarts kan dan een verwijzing regelen.

### **Tot slot**

Deze informatiefolder kan nooit volledig zijn. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde.

Locatie Goes, 0113-234214

Locatie Vlissingen, 0118-425527

KGK234.01.website