

# PICC-lijn

**Deze folder geeft u informatie over een PICC-lijn. Het is goed u te realiseren dat de situatie anders kan zijn dan beschreven. Uw arts heeft voorgesteld om bij u een PICC-lijn te plaatsen vanwege een langdurige infuusbehandeling.**

## **Wat is een PICC-lijn?**

PICC is de afkorting van Perifeer Ingebrachte Centraal Catheter. Een PICC-lijn is een dun slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC-lijn komt in de grote holle ader in de borstkas en ligt dan net boven het hart.

## **Waarom een PICC-lijn?**

De PICC-lijn heeft als voordeel dat er op een veilige, niet pijnlijke manier medicijnen of voeding rechtstreeks in de grote bloedvaten toegediend kunnen worden. De PICC-lijn kan tot een jaar ter plaatse blijven, maar als deze niet meer gebruikt wordt moet de PICC-lijn verwijderd worden.

## **Hoe wordt een PICC-lijn ingebracht?**

Het inbrengen van de PICC-lijn vindt plaats door de physician assistant op de hartcatheterisatiekamer (HCK) in Goes. Het plaatsen neemt in totaal ongeveer een half uur in beslag en gebeurt in een kamer met een sluisstelsel en onder steriele omstandigheden. De medewerker die de PICC-lijn inbrengt, draagt daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen.

## **Hoe gaat het plaatsen van de PICC-lijn?**

De PICC-lijn wordt geplaatst met behulp van een echo in de bovenarm terwijl u op uw rug ligt. De echo wordt gebruikt om het bloedvat te vinden en aan te prikken. Vervolgens wordt er in het bloedvat een zogenaamde voeddraad geplaatst. Over de voeddraad wordt de definitieve PICC-lijn opgeschoven tot boven het hart onder ECG-geleiding.

## **Waar meldt u zich?**

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de dagbehandeling Cardiologie op de 2e verdieping (afdeling L). Wanneer u opgenomen bent, begeleidt een verpleegkundige van de afdeling u.

## **Verzorging van de PICC-lijn**

Een klein gedeelte van de PICC-lijn is buiten het lichaam zichtbaar. De PICC-lijn wordt niet vastgehecht, maar met een speciale fixatiepleister (Statlock®) op zijn plaats gehouden. De insteekopening van de PICC-lijn wordt afgedekt met doorzichtige folie (Tegaderm®). Deze folie voorkomt dat bacteriën via de PICC-lijn het lichaam in kunnen gaan.

Elke keer na gebruik moet de PICC-lijn worden doorgespoten met een zoutoplossing (NaCl 0,9%). Ook als de PICC-lijn even niet in gebruik is, moet deze wekelijks worden doorgespoten.

De Tegaderm® pleister wordt wekelijks verschoond. De Statlock® pleister wordt eens per drie weken verwisseld.

Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, verzorgt de verpleegkundige de PICC-lijn. Thuis neemt de thuiszorg deze zorg over. Zij komen wekelijks bij u langs. Indien u binnen de oncologie de lijn gebruikt, gaan de middelen voor de lijn en de verzorging via de dagbehandeling oncologie.

## **Aandachtspunten**

U mag douchen, maar de Statlock® en de Tegaderm® pleisters moet u laten zitten om loslaten en/of infectie van de PICC-lijn te voorkomen. Wel moet u PICC-lijn volledig afschermen van water door een beschermhoes of doorzichtig huishoudfolie waarmee u uw bovenarm met PICC-lijn omwikkelt.

Laat geen bloed afnemen uit de arm waarin de PICC-lijn zit, wel uit de PICC-lijn zelf. Dit mag alléén een verpleegkundige op de verpleegafdeling of dagbehandeling doen, hierdoor kan er geen bloedafname gedaan worden op het laboratorium.

Meet bij voorkeur niet de bloeddruk aan de arm waarin de PICC-lijn zit.

## **Mogelijke complicaties:**

- Lijninfectie
- Trombosearm

## PICC-lijn

- Nabloeding
- geïnfekteerde insteekopening
- oclusie van de lijn

Neem contact op met uw hoofdbehandelaar bij:

- vocht of pus dat uit de insteekopening komt
- een rode insteekopening
- een gezwollen/dikke insteekopening
- lekkage bij de insteekopening
- koorts > 38.5 °C
- kortademigheid
- pijn op de borst
- problemen met doorspuiten

### **Bereikbaar**

Bij vragen of complicaties kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar. Bij spoedgevallen neemt u contact op met het algemene nummer van het ziekenhuis in Goes, 088 – 125 00 00.