

Pijnbestrijding met een PCEA pomp

Deze folder geeft u informatie over pijnbestrijding met een PCEA-pomp. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

Algemeen

Het is belangrijk voor uw herstel dat u zo min mogelijk pijn ervaart. Pijn mag u niet belemmeren om te verliggen, uit bed te komen of te hoesten. Met minder pijn voelt u zich prettiger en bespoedigd het herstel.

Geef duidelijk aan als u pijn ervaart. Hoe langer u wacht met het bespreekbaar maken van de pijn en eventuele bijwerkingen, hoe moeilijker het wordt ze te beheersen. U krijgt van de verpleegkundige pijnmedicatie (bijvoorbeeld paracetamol) op vaste tijden die u direct moet in nemen. Daarbij krijgt u extra pijnmedicatie via de pijnpomp. Deze combinatie zorgt dat u optimale pijnbestrijding krijgt met zo min mogelijk bijwerkingen.



Bolusknop



Pijnpomp

De pijnpomp (PCEA)

De anesthesioloog heeft u een ruggenprik gegeven en een dun slangetje in uw rug geplaatst voor het aansluiten van een pijnpomp.

De eerste dagen na de operatie krijgt u via de pijnpomp extra pijnmedicatie. De pijnpomp dient zelf voortdurend medicijnen toe. Het kan zijn dat dit niet voldoende is. Als u merkt dat de pijn erger wordt, met name bij inspanning kunt u op de bolusknop drukken om extra pijnmedicatie via de pomp te krijgen. U merkt dat na een korte tijd de pijn afneemt. Neemt de pijn onvoldoende af, dan drukt u opnieuw op de bolusknop.

De pomp is van veiligheidsinstellingen voorzien waardoor u niet teveel pijnstilling kunt toedienen, tenzij u drukt als u helemaal geen pijn ervaart.

U bent de enige die op de bolusknop mag drukken.

Bijwerkingen

Door het gebruik van de pijnpomp kunnen bijwerkingen optreden, zoals:

- slaperigheid
- doofheid, tintelingen of verminderde kracht in een deel van uw heup, knie, benen of voeten
- misselijkheid en braken
- jeuk
- hoofdpijn

Een andere bijwerking kan zijn dat u niet goed voelt of uw blaas vol is of aandrang voelt om te plassen. U heeft daarom een katheter in uw blaas om urine op te vangen. De katheter blijft zitten totdat u de pijnpomp niet meer nodig heeft en het slangetje uit uw rug is verwijderd.

Als u een van genoemde bijwerkingen heeft dan moet u deze melden aan uw verpleegkundige, pijnmedewerker of arts.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze gerust aan uw behandelend arts.