

Allergie huidtest

Deze folder geeft u informatie over een allergie huidtest. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een allergie huidtest is een onderzoek om een allergie voor bepaalde inhalatie- of voedingsallergenen vast te stellen. Bij het onderzoek wordt gebruikgemaakt van een standaardreeks specifieke allergenen, zoals grassen en bomen. Het onderzoek duurt 30 minuten.

Medicijngebruik

Voor het goed slagen van de test moet u stoppen met het innemen van uw medicijnen tegen allergieën. Hieronder staan de meest gebruikte medicijnen waar u minimaal 4 dagen van tevoren mee moet stoppen:

- Aerius
- Allerfre
- Atarax
- Cetirizine
- Claritine
- Cinnarizine
- Cyclizine
- Emesafene
- Fenistil
- Kestine
- Ketotifen
- Mebhydroline
- Mizollen
- Oxatomide
- Periactin
- Polaramine
- Primatour
- Promethazine
- Reactine
- Revalintabs
- Semprex
- Suprimal
- Tavegil
- Telfast
- Terfenadine
- Tinset
- Triludan
- Xyzal
- Zyrtec

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgt u druppeltjes van de allergeenoplossingen op de binnenzijde van de onderarmen. Hierin krijgt u een klein prikje om de allergeenoplossingen in de huid te brengen. Dit is niet pijnlijk, omdat niet door de huid heen wordt geprikt. De huid wordt alleen aangestipt.

Reactie van de huid

Als u allergisch op een van de oplossingen reageert, geeft dit in de huid een reactie. Er ontstaat dan een blaasje, een soort muggenbult, waarbij ook jeuk kan optreden. Na vijftien minuten wordt de reactie bekeken en de grootte van de blaasjes opgemeten. Na het onderzoek kunt u nog wat last van de blaasjes hebben, deze trekken vanzelf weer weg.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts.