

Behandeling aangezichtszenuw

Ganglion sfenopalatinum

Deze folder geeft u informatie over een behandeling van de aangezichtszenuw (ganglion sfenopalatinum). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

In te vullen door behandelaar

Aankruisen welke behandeling van toepassing is:

- Corticosteroïden
- PRF
- PRF

Wel/niet stoppen met bloedverdunners:

- Ja, stoppen met de bloedverdunners _____ dagen voor de behandeldatum.
- Nee, hoeft niet gestopt te worden.
- Niet van toepassing.

Doel behandeling

Het ganglion sfenopalatinum is een kleine zenuwknoop gelegen bij de oogkas en neusholte. Deze zenuwknoop bevindt zich zowel links als rechts van uw gezicht. Het doel van de behandeling is om de pijngeleiding van deze zenuwknoop voor langere tijd uit te schakelen.

Vorbereiding behandeling

U hoeft thuis geen specifieke voorbereidingen treffen, tenzij uw pijnarts anders aangeeft. In principe mag u van tevoren gewoon eten en drinken. Houd wel rekening met de onderstaande zaken:

- Als u verhinderd bent op de dag van de behandeling, kunt u het beste contact opnemen met het polikliniek Pijn geneeskunde.
- Gebruikt u antibiotica? Geef dit dan voorafgaand aan de behandeling door aan uw pijnarts.
- Neemt u bloedverdunners? Bespreek dit dan van tevoren met uw arts, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Meestal moet u de bloedverdunners een tijd voor de behandeling

stoppen of vervangen door een ander geneesmiddel.

- Heeft u een allergie voor jodium of andere ontsmettingsmiddelen, pleisters, contrast- of verdovingsmiddelen? Meldt dit dan voor de start van de behandeling.
- Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Meld dit dan voor de start van de behandeling.
- Op de dag van uw behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg daarom voor een begeleider die u na de behandeling naar huis kan begeleiden.

Verloop behandeling

U wordt op de afgesproken tijd verwacht op de polikliniek Pijn geneeskunde. Deze vindt u op de eerste verdieping van ons ziekenhuis in Goes. U meldt zich bij de balie en geeft hier uw toestemmingsverklaring af (als u deze van tevoren heeft ontvangen).

Wij helpen u om in de juiste positie op de behandelafel te gaan liggen of zitten. Na het schoonmaken van de huid met een desinfecterende vloeistof wordt het behandelgebied afgedekt met steriele doeken. De pijnarts verdooft het te behandelende gebied. Als de naald in de juiste positie is, geeft de pijnarts de medicatie, de verdovingsvloeistof en het ontstekingsremmende middel (corticosteroïd). De behandeling duurt doorgaans zo'n 15-20 minuten. Op de plaats van de injectie wordt een pleister geplakt, deze mag u na een paar uur verwijderen.

Na de behandeling wordt u naar een speciale ruimte gebracht waar u in een comfortabele ligstoel mag plaatsnemen en wordt geobserveerd door een verpleegkundige. U mag iets meenemen ter ontspanning zoals een (puzzel)boek of muziek.

Houd er rekening mee dat u ongeveer 1-2 uur op de

polikliniek Pijn geneeskunde aanwezig bent. Voordat u naar huis gaat, maakt u een controleafspraak.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

We voeren de behandeling vanzelfsprekend zorgvuldig uit. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van bijwerkingen of complicaties:

- Napijn. Dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen. U kunt hiervoor uw pijnstillers innemen.
- Er is een kleine kans op het optreden van een doof gevoel in het gehemelte. In zeldzame gevallen treedt er een doof gebied op bij de bovenkaak en/of tandenrij.
- Doof gevoel in behandelgebied. Dit verdwijnt na enkele uren als de verdoving is uitgewerkt.
- Na de behandeling kan een bloedneus optreden, ook nog na 24 uur.
- U kunt (na toediening van corticosteroïden) opvliegers en een rood, warm gezicht krijgen. Deze bijwerking kan zowel bij vrouwen als mannen optreden. Bij vrouwen kan de menstruatie een cyclus verstoord raken.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms wat pijn.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele weken te beoordelen. In een aantal gevallen is een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk. Uw pijnarts zal dit verder met u bespreken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijn geneeskunde. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer 088 125 00 00.