

Gastroscoopie

Deze folder geeft u informatie over een gastroscoopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Tijdens een gastroscoopie wordt er met een gastroscoop, dit is een buigzame soepele slang die bestuurbaar is, gekeken in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm, om er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Op deze manier kan de arts ontstekingen, zweertjes en gezwellen waarnemen en de oorzaak van bloedingen opsporen. Bepaalde kleine ingrepen kunnen uitgevoerd worden door een instrument door het kanaal van de scoop te schuiven. Zo kan de arts stukjes weefsel voor onderzoek wegnemen (biopten), vernauwingen opheffen, poliepen weghalen en bloedingen stelpen. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.

Vorbereiding

Als u 's ochtends komt voor het onderzoek dan mag u niets meer eten of drinken vanaf 00.00 uur 's nachts. Komt u 's middags dan mag u 's ochtends voor 09.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken (twee beschuiten en een kopje thee).

Praktische tips

- Overleg met uw arts als u antistolling gebruikt.
- Overleg met uw arts als u een pacemaker of ICD heeft.

Het onderzoek

Eventuele vragen kunt u voor of na het onderzoek stellen. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze in de onderzoekskamer vóór het onderzoek uitdoen. Als u nog in het bezit bent van uw eigen tanden, krijgt u een bijtring in uw mond. Dit om te voorkomen dat u (per ongeluk) in de scoop bijt. Voor het onderzoek wordt uw keel verdoofd door middel van een spray. U ligt op uw linkerzijde op de onderzoektafel. De scoop wordt door de mond naar binnen geschoven en via de slokdarm naar de maag en de twaalfvingerige darm geleid. De arts geeft u aanwijzingen om de scoop in te slikken. Het eerste stukje kan een vervelend gevoel geven. U kunt tijdens het onderzoek gewoon ademen, maar niet praten. Tijdens het onderzoek wordt lucht via de scoop ingeblazen. Het kan zijn dat u daarvan moet boeren. Het eigenlijke onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Aandachtspunten na het onderzoek

- Als uw keel verdoofd is, mag u na een half uur weer wat eten en drinken.
- Uw huisarts kan in overleg met de specialist zorgen dat u een sedatie middel toegediend krijgt. U mag dan niet zelf autorijden.
- Als tijdens het onderzoek een ingreep heeft plaatsgevonden, kunnen extra controles nodig zijn. Welke dat zijn, bepaalt de arts.
- Het kan zijn dat uw keel na het onderzoek tijdelijk pijnlijk is. Vooral als u heeft moeten hoesten. U heeft misschien een opgeblazen gevoel. Opboeren of winden laten, geeft verlichting.

Uitslag

Soms kan de arts die het onderzoek verricht heeft u alvast een voorlopige uitslag geven. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is niet meteen beschikbaar. Het kan zijn dat verder onderzoek of behandeling geadviseerd wordt. Uw arts bespreekt dit verder met u. In principe mag u na het onderzoek naar huis.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u verwacht wordt.

Gastroscopie

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in:

Datum:

Tijd:

Afdeling:

Locatie:

Verrichtingencentrum Goes
(0113 234 417)

PKOK Vlissingen
(0118 425 250)

Polikliniek Interne geneeskunde
(0113 234 549)

Naam specialist:
