

# Blutgerinnungshemmung mit Fraxiparin®

## Bei Gips am Unterschenkel

**Diese Broschüre gibt Ihnen wichtige Informationen über Gips am Unterschenkel und Blutgerinnungshemmung. Bitte beachten Sie, dass Ihre individuelle Situation eine andere sein kann als die im folgende beschriebene Situation.**

Sie haben einen Gips bekommen, durch den Sie Ihr Bein, oder einen Teil davon, nicht mehr gut bewegen können. Dadurch fließt das Blut nicht mehr auf normale Weise durch die Beinvenen und es können Venenthrombosen entstehen. Zur Vorbeugung gegen eine Venenthrombose haben Sie ein Rezept für Fraxiparin® erhalten.

In dieser Broschüre wird Ihnen erklärt :

- was Venenthrombosen sind
- wie Sie einer Venenthrombose vorbeugen können
- wie Sie Fraxiparin® einnehmen müssen

### Was ist eine Venenthrombose?

Eine Venenthrombose ist die Bezeichnung für die Blutgerinnung in einem Blutgefäß, in welchem dies normalerweise nicht vorkommt. Dadurch, dass Sie Ihr Bein (oder einen Teil davon) aufgrund des Gipses nicht bewegen können, kommt das Blut im Bein zum Stillstand. Infolge dieses Stillstandes kann das Blut zur Gerinnung kommen. Die Blutgerinnsel können sich lösen, sich an einer anderen Stelle in der Blutbahn festsetzen und ein Gefäß verstopfen. Oft geschieht das in den Lungen. Dann ist von einer Lungenembolie die Rede. Im Falle einer Lungenembolie kommt es in den Lungen zu einer Störung der Sauerstoffaufnahme und Sie empfinden eine akute Atemnot.

### Wie Sie einer Venenthrombose vorbeugen können?

Zur Vorbeugung von Venenthrombosen und Lungenembolien wird Ihnen Fraxiparin® verordnet. Dieses Medikament bewirkt eine Hemmung der Blutgerinnung. So lange Sie den Gipsverband tragen, muss das Medikament einmal täglich eingenommen werden.

Nähere Informationen über Venenthrombosen, Lungenembolie und Fraxiparin® finden Sie auf den folgenden Webseiten:

- [De.wikipedia.org/wiki/Thrombose](https://de.wikipedia.org/wiki/Thrombose)
- [De.wikipedia.org/wiki/Lungenembolie](https://de.wikipedia.org/wiki/Lungenembolie)
- [Deutsche-gefaesslige.de/venenthrombose.html](https://deutsche-gefaesslige.de/venenthrombose.html)
- [Trombosestichting.nl](https://trombosestichting.nl)
- [Trombose.nl](https://trombose.nl)

### Wie Sie Fraxiparin® einnehmen müssen?

Ihnen wird ein Rezept ausgestellt, mit dem Sie dann Fraxiparin® in der Apotheke abholen müssen. Spritzen Sie sich das Medikament einmal täglich zum selben Zeitpunkt und berücksichtigen Sie dabei Folgendes:

- Anwendung: Die Anwendung entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Broschüre.
- Einstichstelle: Die Einstichstellen sollen regelmäßig gewechselt werden. An der Einstichstelle können blaue Flecken entstehen.
- Beginn: Sobald Ihr Bein eingegipst worden ist, müssen Sie mit Fraxiparin® beginnen.
- Ende: Sobald der Gips entfernt worden ist, müssen Sie die Einnahme von Fraxiparin® beenden.

Fraxiparin® wird in der Regel in Spritzen von 0,3 ml oder 0,4 ml verabreicht. Es kann aber auch sein, dass Sie eine andere Dosis erhalten.

### Schlussbemerkung

Wenn Sie bzgl. der Anwendung von Fraxiparin® Fragen haben oder, wenn Probleme damit auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Hausarzt oder mit dem behandelnden Arzt in Verbindung.