

TURB

Deze folder geeft u informatie over de een TURB-operatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Wat is een TURB

Uw uroloog heeft bij u de diagnose gesteld van een blaas poliep (blaastumor). Dit betekent dat uw aandoening in principe steeds een kwaadaardig karakter heeft. In samenspraak met uw uroloog is beslist om de blaastumor weg te nemen. De ingreep wordt afgekort een TURB genoemd.

Wat is een blaastumor

Het woord blaastumor wordt gebruikt voor alle tumoren die uitgaan van de wand in de urinewegen of van de blaaswand. De agressiviteit is in de meeste gevallen gering en kan goed behandeld worden. Blaastumoren geven weinig klachten, soms is er in de urine bloed zichtbaar. Blaastumoren worden onderverdeeld in:

- Oppervlakkig groeiende tumoren uitgaande van het blaaslijmvlies, die niet ingroeien in de spierwand.
- In de diepte groeiende tumoren die zich wel tot in de spierwand uitbreiden.

Er zijn een aantal factoren bekend die deze tumoren kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld roken. Ook andere toxische stoffen kunnen een belangrijke invloed hebben, zoals: de verfindustrie, petrochemische industrie en haarcosmetica. Een blaastumor moet altijd worden verwijderd omdat deze groter kan worden, bloedingen kan veroorzaken en dieper in de blaaswand kan ingroeien. Er is langdurige nazorg nodig met bijvoorbeeld regelmatige cystoscopische controles. Aanvullend onderzoek kan nodig zijn.

Vorbereiding

Het is belangrijk van te voren aan uw uroloog te melden:

- Als u onder controle bij de trombosedienst staat of u slikt regelmatig Marcoumar, Sintrom, Plavix, Persantin, Ascal, Aspirine of sinaspril.
- Direct na de ingreep moet u navragen bij uw uroloog wanneer u weer met bovenstaande medicijnen mag starten.

De operatie TURB

De behandeling bestaat uit het operatief verwijderen van de tumor door middel van een TURB. Hierdoor kan de uroloog in de blaas kijken en afwijkend weefsel uit de blaas weghalen. Als de operatie klaar is, wordt er tijdelijk een katheter geplaatst om de urine uit de blaas te lozen.

Na de operatie

U kunt een branderig gevoel tijdens het plassen ervaren. De urine kan na de operatie licht bloederig zijn. De frequentie en aandrang om te plassen kunnen tijdelijk verhoogd zijn.

Advies voor thuis

- Drink 1½ tot 2 liter vocht per dag.
- Onderneem de eerste week geen inspannende activiteiten.
-

U krijgt een afspraak mee voor controle bij uw behandelend uroloog op de polikliniek.

Mogelijke klachten na de operatie

Het herstel duurt ongeveer zes weken. Dit betekent dat u na de ingreep nog enige tijd plasproblemen kunt hebben. Deze kunnen bestaan uit het nog steeds plassen van iets bloed, dikwijls moeten plassen, snel moeten plassen of verliezen van urine. Bij tijdelijk verlies van urine krijgt u van de verpleegkundige een startpakket met incontinentiemateriaal mee voor thuis. Heeft u meer materiaal nodig dan kunt u dit zelf bestellen bij de leverancier. De machtiging voor de zorgverzekering is geregeld door de verpleegkundige die u het startpakket heeft gegeven.

Belangrijk

Neem contact op met uw behandelend arts als:

- Het bloedverlies niet vermindert.
- U een temperatuursverhoging heeft van 38,5 °C.
- U blijvende brandende pijn bij het plassen heeft.
- U niet meer kunt plassen.

TURB

Uitslag van het onderzoek

Uw uroloog bespreekt met u of er nader onderzoek of behandeling nodig is.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie van het ziekenhuis (088-1250000).