

Besnijdenis (circumcisie)

Deze folder geeft u informatie over besnijdenis (circumcisie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Circumcisie

Bij een besnijdenis wordt de gehele, of een gedeelte van de voorhuid van de penis operatief verwijderd. Door vernauwing van de voorhuid (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Klachten die daardoor kunnen optreden zijn: moeilijkheden bij het plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap, een ontsteking rond de eikel en dergelijke.

Het kan ook uw wens zijn dat uw zoon wordt besneden om religieuze redenen of omdat u het hygiënischer vindt. De behandelend arts bespreekt met u de reden, waarom voor uw zoon deze operatie gewenst is. Deze operatie wordt in Adrz niet om religieuze redenen uitgevoerd.

Voorbereiding

Het is belangrijk van te voren aan uw uroloog te melden:

- als u onder controle bij de trombosedienst staat of u slikt regelmatig Marcoumar, Sintrom, Plavix, Persantin, Ascal, Aspirine of sinaspril
- direct na de ingreep moet u navragen bij uw uroloog wanneer u weer met bovenstaande medicijnen mag starten

De operatie

De operatie wordt meestal poliklinisch gedaan onder plaatselijke verdoving. Er wordt dan één injectie aan de basis van de penis gegeven. De hele penis kan op deze manier worden verdoofd. Bij kinderen en in uitzonderlijke gevallen kan de operatie onder algehele verdoving (narcose) plaatsvinden. De bedoeling van de operatie is om de voorhuid van de eikel los te maken. De voorhuid wordt geheel of gedeeltelijk verwijderd, waardoor de eikel na de operatie geheel of gedeeltelijk onbedekt blijft. De huid wordt gehecht met hechtingen die vanzelf oplossen. Hechtingen zitten in een krans rond de eikel.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor.

Na de operatie

Het is verstandig om het op de dag van de ingreep rustig aan te doen. Na drie tot vier uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug. U kunt dan wat pijnklachten hebben en mag hiervoor een Paracetamol innemen. Zorg dat u deze in huis heeft.

Het plassen kan de eerste keer een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt bij doorplassen. Het gaasje dat ter bescherming na de ingreep is aangebracht kan verwijderd worden. Indien het verband of de onderbroek aan de wond vastzit, dit in geen geval lostrekken. Losweken met lauw water is de juiste manier. Kort na de ingreep ziet de penis er gezwollen en blauw/rood uit. Dit verdwijnt in de loop van de week. Het is het beste om de penis omhoog te leggen, richting navel en de eerste dagen na de ingreep een strakke onderbroek te dragen.

De basisregel bij wondbehandeling is het schoon en droog houden van het wondgebied. Er kan gewoon gedoucht worden, maar het is niet verstandig de eerste week te zwemmen of te baden.

Als uw kind nog niet zindelijk is, is het noodzakelijk dat frequent de luier verschoond wordt. Indien u incontinentiemateriaal draagt is het ook noodzakelijk dit frequent te verschonen.

Besnijdenis (circumcisie)

Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes, die kunnen gaan schrijnen. Dit kan worden verminderd door na het douchen het wondgebied in te smeren met witte vaseline. Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving. Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk.

Controle afspraak

Als u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle.

Vergoeding

Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar na of u de behandeling vergoed krijgt.

Wat moet u doen bij problemen

Als u aanhoudende pijn of koorts heeft, neem dan contact op met de polikliniek Urologie via de receptie van het ziekenhuis (088 125 00 00). In spoedeisende gevallen kunt u 's avonds en in het weekend contact opnemen via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis in Goes (088 125 00 00) of de huisartsenpost in uw regio.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie van het ziekenhuis (088 125 00 00). Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.