

Nazorg afstaande oren bij kinderen

Deze folder geeft u informatie over nazorg bij een oorcorrectie. Het is goed u te realiseren dat voor u(w kind) de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uw kind heeft zojuist een oorcorrectie ondergaan. Hierbij werd door de plastisch chirurg het kraakbenig skelet van de oorschelp gecorrigeerd met als doel afstaande oren op te heffen. Het litteken loopt aan de achterzijde van het oor en is daardoor nauwelijks zichtbaar.

Na de behandeling

De oren zijn blauw en gezwollen, de bloeditstoringen trekken vrij snel weer weg. De zwelling is een aantal weken zichtbaar. Hierdoor zijn de oren enige tijd dikker dan normaal. Het uiteindelijke resultaat is na 3 maanden te beoordelen.

Uiteraard streeft de plastisch chirurg bij deze ingreep naar symmetrie tussen de beide oren. Kraakbeen is echter een weerbarstig weefsel en kan dus terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm. Een garantie op absolute symmetrie valt dan ook niet te geven.

Uw kind heeft een drukverband onder de elastische band/haarband gekregen. Dit laat u 48 uur zitten, waarna u dit zelf mag verwijderen. Er is gehecht met oplosbare hechtingen, de uiteinden hiervan worden tijdens de eerste controle, na 1 week, afgeknipt.

Nazorgadviezen

- Het is raadzaam om de eerste dag na de operatie uw kind rustig aan te laten doen.
- Gedurende de eerste week moet uw kind dag en nacht een elastische band/haarband dragen om de oren te beschermen. Hierna adviseren wij om uw kind nog 2 weken extra (in het totaal dus 3 weken) 's nachts en tijdens het sporten een brede haarband te dragen. 's Nachts is dit belangrijk, omdat er een risico bestaat dat het oor dubbel komt te liggen op het kussen.
- Na 1 week mag het haar weer gewassen worden, let er dan wel op dat bij het afdrogen de oren niet naar voren worden getrokken.

- Wij adviseren u om uw kind 6 weken geen contactsporten uit te laten oefenen, geen helm te laten dragen en niet te laten zwemmen. Alle overige lichaamsbewegingen zijn toegelaten, wel met zo nodig een bescherming van de elastische band/haarband.

Medicatie

Ter voorkoming van napijn is kinderparacetamol toegestaan, kijk voor de toegestane hoeveelheid in de bijsluiter.

Gebruikt uw kind andere medicatie zoals bloedverdunders, dan mogen deze ten vroegste 24 uur na de ingreep weer worden hervat.

Controleafspraken

Eerste controle

- 1 tot 2 weken na de operatie bij de doktersassistente/verpleegkundige, zo nodig volgt een tussentijds controle

Tweede controle

- 3 maanden na de operatie bij de plastisch chirurg en de medische fotograaf voor het maken van de na foto's. Het maken van de foto's is alleen mogelijk op de locatie Goes.

Contact bij vragen en/of complicaties

In de volgende situaties neemt u contact met ons op:

- Bij bloedverlies, welke na afduwen niet verminderd.
- Aanhoudende pijn, welke niet verminderd na het innemen van de toegestane dosis pijnstilling, zeker wanneer de pijn eenzijdig is.
- Een temperatuur boven de 38,5 °C.

Nazorg afstaande oren bij kinderen

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u bellen naar de poli plastische chirurgie 088 – 125 7331 (op werkdagen van 09.00 uur – 12.30uur).

Voor spoedgevallen na 17.00 uur neemt u contact op met de receptie van Adrz locatie Goes 088 – 125 0000, u vertelt door welke plastisch chirurg uw kind is geopereerd en wat de klachten zijn, zij nemen dan contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.