

Blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker

Deze folder geeft u informatie over blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Therapie met blaasspoeling is een behandeling waarbij een antikanker medicijn direct in de blaas wordt gebracht. Deze therapie wordt gebruikt voor behandeling en ter voorkoming van oppervlakkige blaastumoren of blaaspoliepen. Vraag goed na welke spoeling u krijgt.

Mitomycine

Mitomycine is een medicijn, dat de celdeling van tumorcellen remt (chemotherapie). Tumorcellen onderscheiden zich van de normale cellen doordat ze zich ongeremd delen. Mitomycine grijpt in waardoor de celdeling wordt geremd en uiteindelijk afsterft.

Vorbereiding

- U mag vier uur vóór de blaasspoeling niet drinken, omdat de blaas tijdens de behandeling zo leeg mogelijk moet blijven.
- Gebruikt u plastabletten, neem deze niet in vóór de spoeling, maar erna.
- Zorg dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent.
- De blaasspoeling wordt speciaal voor u klaar gemaakt.
- Als u zich koortsig heeft gevoeld, ongewoon moe bent geweest, of bloedstolsels in uw urine heeft gezien na de laatste behandeling bespreek dit dan met de uroloog.
- Uw geslachtsdelen worden schoongemaakt.
- Een verpleegkundige gaat u katheteriseren (met een slangetje de blaas helemaal leeg maken), zodat nog achtergebleven urine wordt verwijderd.

De behandeling

De spoeling wordt door de katheter in de blaas gebracht. Dit duurt een paar minuten. Vervolgens wordt, in de meeste gevallen, de katheter verwijderd. De oplossing blijft twee uur in de blaas, maar minimaal een uur.

Spoelen tijdens opname (direct na blaasoperatie TURB)

Spoelen gebeurt binnen 24 uur na de operatie. De spoelvloeistof blijft twee uur in de blaas. De katheter wordt verwijderd door een verpleegkundige. Nadat de katheter is verwijderd gaat u meteen met ontslag.

Na de behandeling

- Ga direct na de behandeling naar huis; gebruik geen toilet in het ziekenhuis.
- De eerste 48 uur na de spoeling plast u zittend. Zorg dat u na toiletgebruik uw handen en geslachtsdeel zorgvuldig wast.
- Toilet tweemaal doorspoelen met deksel naar beneden.
- Maak dagelijks het toilet schoon met PH-neutrale zeep.
- Zorg dat u de eerste uren nadat de spoeling eruit is voldoende drinkt om uw blaas schoon te spoelen. Extra drinken vermindert het branderige gevoel.
- Het is belangrijk dat u bij een volgend bezoek aangeeft of u:
 - * na de behandeling misselijk blijft
 - * dikwijls moet plassen
 - * rode vlekken op uw handen, voeten en rondom uw geslachtsdeel heeft
- Heeft u problemen met plassen, bijvoorbeeld helder rood of pijnlijk plassen of een snijdende pijn in de blaas, neem dan direct contact op met de polikliniek Urologie.
- Geslachtsgemeenschap is de eerste 48 uur niet toegestaan zonder gebruik van een condoom.
- Heeft u last van urineverlies, gebruik dan speciale inleggers voor urine incontinentie. Gooi deze de eerste 48 uur weg in een dubbele vuilniszak.

Na de behandeling met verblijfskatheter

- Spoelvloeistof wordt door de katheter ingebracht en wordt gedurende twee uur afgeklemd.
- Na twee uur verwijdert u de klem en laat de vloeistof aflopen in de katheterzak. Vervang vervolgens de zak (ongeveer na vijftien minuten).
- De eerste 48 uur doet u volle urinezakken in een dubbele vuilniszak in de huisafval container (niet legen in het toilet).

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze gerust aan uw behandelend arts.

Afspraak

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie van het ziekenhuis (088-1250000).