

Mictiecystogram volwassenen

Deze folder geeft u informatie over mictiecystogram bij volwassenen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een mictiecystogram op de afdeling Radiologie van Adrz. Bij dit onderzoek wordt de blaas en plasbuis onderzocht op eventuele afwijkingen. Door het inbrengen van contrastmiddel kan dit lichaamsdeel zichtbaar gemaakt worden.

Van tevoren melden?

Het is belangrijk dat u ruim voordat het onderzoek plaatsvindt contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

- zwanger bent of denkt dat te zijn. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd als het strikt noodzakelijk is.
- als u een tillift nodig heeft. Wij kunnen dan extra tijd inplannen voor het onderzoek.
- een allergie heeft voor jodium.

Vorbereiding

Medicijngebruik

Uw medicijnen kunt u op de normale manier en tijdstippen innemen, tenzij anders met u is afgesproken. Indien u twijfelt over het innemen van de medicatie, overleg dan met uw behandelend arts.

Kleding

Voor het onderzoek is het nodig dat u zich gedeeltelijk ontkleedt. Het is prettig wanneer u kleding aan heeft die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Kledingstukken met metalen ritsen of sluitingen mag u niet aanhouden tijdens het onderzoek. Laat uw sieraden en waardevolle spullen thuis.

Contrastmiddel

Het is niet altijd mogelijk om de organen, die onderzocht worden, rechtstreeks goed af te beelden op de röntgenfoto's. Om die reden wordt er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel.

Verloop van het onderzoek

U gaat een half uur vóór het onderzoek eerst naar de polikliniek Urologie voor het inbrengen van een blaaskatheter (tenzij een ander tijdstip met u is afgesproken). Hierna meldt u zich op de afdeling Radiologie. Op de afdeling Radiologie haalt een laborant(e) u op uit de wachtkamer. Voordat het onderzoek begint, legt hij/zij u uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen als u iets niet begrijpt.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Boven deze tafel staat een röntgenapparaat waarmee de foto's worden gemaakt. De laborant(e) bevestigt een infuussysteem met het contrastmiddel aan de blaaskatheter. Via deze katheter wordt het contrastmiddel in de blaas ingebracht. Wanneer de blaas vol is en u het gevoel van aandrang heeft wordt de katheter verwijderd. U wordt gevraagd de blaas te legen. Gedurende het gehele onderzoek worden röntgenfoto's gemaakt.

Na het onderzoek kunt u gebruik maken van het toilet in de kleedkamer. U kunt zich hier ook wassen.

Mictiecystogram volwassenen

Duur van het onderzoek

Het hele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan het plassen wat pijnlijk zijn. Soms komt er ook wat bloed mee. Dit gaat vanzelf weer over. Het is van belang dat u veel drinkt om een infectie door het inbrengen van de katheter te voorkomen.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Verhinderd

Kunt u niet naar het onderzoek komen? Dan vragen wij u dit ten minste 24 uur voor het onderzoek te melden bij de afdeling Radiologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 088 125 43 60.