

# Gastroscoopie

**Deze folder geeft u informatie over een gastroscoopie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.**

Tijdens een gastroscoopie wordt er met een gastroscoop, dit is een buigzame soepele slang die bestuurbaar is, gekeken in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm, om erachter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Op deze manier kan de arts ontstekingen, zweertjes en gezwellen waarnemen en de oorzaak van bloedingen opsporen. Bepaalde kleine ingrepen kunnen uitgevoerd worden door een instrument door het werkkanal van de gastroscoop te schuiven. Zo kan de arts stukjes weefsel voor onderzoek wegnemen (biopten), vernauwingen opheffen, poliepen weghalen en bloedingen stelpen. Deze ingrepen zijn niet pijnlijk.

## Vorbereiding

Als u 's ochtends komt voor het onderzoek dan mag u niets meer eten of drinken vanaf 00.00 uur 's nachts. Komt u 's middags dan mag u 's ochtends voor 07.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken (twee beschuiten en een kopje thee). Inhalatie medicatie mag u gewoon doorgebruiken zoals u gewend bent.

## Praktische tips

- Overleg met uw arts als u antistolling of insuline gebruikt. Mogelijk moeten deze aangepast of gestopt worden voor het onderzoek.
- Overleg met uw arts als u een pacemaker of ICD heeft.
- Uw huisarts kan in overleg met de specialist zorgen dat u een sedatie middel toegediend krijgt. Echter mag u na de gegeven sedatie op de dag zelf **niet zelfstandig** deelnemen aan het verkeer. Regel voor het onderzoek dat iemand u naar huis kan brengen. Zie ook de meegeven sedatie folder.

## Het onderzoek

Eventuele vragen kunt u voor of na het onderzoek stellen. Als u een gebitsprothese/gehoorapparaat heeft, moet u deze in de behandelkamer vóór het onderzoek uitdoen. Vlak voor het onderzoek wordt uw keel verdoofd door middel van een spray zodat u minder last heeft van kokhalsneigingen. De spray geeft een dik gevoel in de keel. Echter kan u gewoon slikken en is de keel niet opgezwollen zodat er voldoende ruimte is om gewoon te ademen via de mond/neus tijdens het onderzoek. Ook krijgt u een bijtring in uw mond. Dit ter bescherming van de scoop en eventueel uw eigen tanden. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de behandelafel. De gastroscoop wordt door de mond naar binnen geschoven en dit kan een vervelend gevoel geven. Echter geeft de arts/verpleegkundige u aanwijzingen om de scoop in te slikken. Tijdens de gastroscoopie wordt de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm bekeken. Om dit goed te kunnen doen, wordt er lucht/CO2 via de gastroscoop ingeblazen. Het kan zijn dat u daarvan moet boeren. Hiervoor hoeft u zich niet te schamen. Het eigenlijke onderzoek duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

## Aandachtspunten na het onderzoek

- Als uw keel verdoofd is, mag u na een half uur eerst een slokje water drinken en gaat dit goed dan mag u weer wat eten en drinken.
- Als tijdens het onderzoek een ingreep heeft plaatsgevonden, kunnen extra controles nodig zijn. Welke dat zijn, bepaalt de arts.
- Het kan zijn dat uw keel na het onderzoek tijdelijk pijnlijk is. Vooral als u heeft moeten boeren/kokhalzen. Als u een opgeblazen gevoel heeft, geeft opboeren of winden laten een verlichting.

### Complicaties

Op zich is een gastroscoopie een veilig onderzoek maar indien er nog voedsel in de maag aanwezig is, is er een kans dat u het voedsel op boert. Als het voedsel in de luchtpijp komt kan dit mogelijk een luchtweginfectie geven. Krachtig opboeren tijdens het onderzoek kan het slokdarmvlies beschadigen. Er is een kleine kans dat dit een bloeding veroorzaakt. Wanneer de gastroscoop moeizaam de keel passeert of wanneer er vernauwingen in de slokdarm zijn, kan er een scheurtje in de slokdarm ontstaan.

### Uitslag

Soms kan de arts die het onderzoek verricht heeft u alvast een voorlopige uitslag geven. De uitslag van eventueel weefselonderzoek is niet meteen beschikbaar. Het kan zijn dat verder onderzoek of behandeling geadviseerd wordt. Uw arts bespreekt dit verder met u. In principe mag u na het onderzoek naar huis.

### Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in:

---

Datum:

---

Tijd:

---

Afdeling:

---

Naam specialist:

---

### Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de planning van de gastroscoopie, dan kunt u de afdeling SBA bellen via het telefoonnummer 088 125 52 50.

Voor vragen over het onderzoek kunt u 088 125 45 49 of 088 125 51 41 bellen.

Voor overige vragen kunt u het afsprakenbureau 088 125 00 00 bellen.