

Botoxbehandeling overactieve blaas

Deze folder geeft u informatie over een botoxbehandeling bij een overactieve blaas. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Een overactieve blaas

Uw uroloog heeft aan de hand van verschillende urologische onderzoeken vastgesteld dat u een overactieve blaas heeft. Bij een overactieve blaas moet u vaak ineens plassen en lukt het niet goed om uw plas op te houden. De gangbare behandeling met bekkenbodempysiotherapie en medicijnen hebben bij u onvoldoende resultaat, daarom heeft u in overleg met uw uroloog gekozen voor een behandeling met botox.

Signaaloverdracht zenuwvezels naar spieren

Botox is een afkorting voor botuline-toxine. Dit medicijn is een product van bacteriën dat de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren onderbreekt. Als botox in de blaasspier wordt ingespoten, wordt de signaaloverdracht van de zenuwen naar de blaasspier onderbroken. Hierdoor neemt het samentrekken van de blaas af. Het gevoel van aandrang neemt af en u kunt beter en langer uw plas ophouden.

Medicijngebruik vooraf melden

Het is belangrijk van tevoren aan uw uroloog te melden of u onder controle staat bij de Trombosedienst of regelmatig Marcoumar, Sintrom, Plavix, Persantin, Ascal, Aspirine of Sinaspril slikt. Direct na de ingreep moet u bij uw uroloog navragen wanneer u weer met bovenstaande medicijnen mag starten

Vorbereiding behandeling

U neemt plaats op een speciale bank, waar de verpleegkundige met het toedienen van de verdoving start. De verpleegkundige brengt een katheter in met verdovingsvloeistof. Na het inbrengen van de verdovingsvloeistof wordt de katheter weer verwijderd. De verdovingsvloeistof blijft zo'n drie kwartier in de blaas, zodat de verdoving goed kan inwerken. Daarna gaat u naar de cystoscopiekamer en neemt plaats op een speciale stoel met uw benen in de beensteunen. Vooraf plast u de verdoving uit. De verpleegkundige maakt uw onderlichaam schoon en dekt u daarna af met een steriele doek.

Verloop behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie (routenummer 23) in Goes. De uroloog brengt een flexibel kijkinstrument met ingebouwde camera (cystoscoop) in, in uw blaas. Via een zijkanaal van de cystoscoop wordt de botox via een speciale naald toegediend. Eerst vult de uroloog uw blaas met steriel water, waardoor de blaas tot ontplooiing wordt gebracht en wijder wordt. Op de monitor kan de uroloog de binnenzijde van uw blaas goed zien. Ook u kunt dit hele proces op een monitor volgen. Via de naald wordt op verschillende plaatsen in uw blaas een kleine hoeveelheid botox ingespoten.

Na de behandeling

Nadat de uroloog de cystoscoop heeft verwijderd, bestaat de kans dat u nog enige tijd aandrang voelt om te plassen. Ook kunt u nog een aantal dagen last hebben van een branderig gevoel. De eerste dagen na de behandeling kunt u wat bloed hebben in de urine. Het is daarom belangrijk dat u veel drinkt.

Botoxbehandeling overactieve blaas

Contact bij problemen

Als u aanhoudende pijn of koorts heeft, niet meer kunt plassen, er langer dan twee dagen bloed in de urine aanwezig is of er komt steeds meer bloed in de urine neem dan contact op met de polikliniek Urologie. Dit kan via de receptie van het ziekenhuis: 088 125 00 00.

In spoedeisende gevallen kunt u 's avonds en in het weekend contact opnemen via het bovenstaande nummer of met de huisartsenpost in uw regio.

Afspraak maken, annuleren of verzetten

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten? Neem dan contact op met de Afspraakcentrale. Dit kan via telefoonnummer 088 125 00 00.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.