

MIBG scintigrafie

Deze folder geeft u informatie over een MIBG scintigrafie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Doel van het onderzoek

Met behulp van MIBG-scintigrafie kunnen diverse ziekteprocessen in het lichaam opgespoord worden. Uw behandelend arts legt u uit waarom dit onderzoek bij u wordt gedaan.

In het ziekenhuis

- Als u voor de eerste keer naar Adrz komt, kunt u zich bij de receptie in de centrale hal laten inschrijven. Zorg dat u uw zorgpas en identiteitsbewijs (geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart) bij de hand heeft. Uw persoonlijke gegevens worden gevraagd.
- Uw gegevens komen op stickers te staan. Deze stickers worden gebruikt om uw behandeling administratief te kunnen verwerken. Wij raden u daarom aan om een kwartier voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
- Bent u al ingeschreven maar zijn er veranderingen in uw gegevens, bijvoorbeeld nieuwe ziektekostenverzekeraar of een verhuizing, geef deze dan altijd door bij de receptie.
- De identificatieplicht is ook dan van toepassing.
- Meldt u zich vervolgens bij de afdeling Nucleaire geneeskunde in Goes, route 15.

Vorbereiding voor het onderzoek

Om de radioactieve stof naar de juiste plaatsen de leiden, neemt u drie dagen 's morgens twee capsules Kaliumperchloraat in.

- De eerste twee capsules neemt u een dag voor de injectie in met water.
- De volgende twee capsules neemt u 's ochtends op de dag van de injectie in.
- De laatste twee capsules neemt u 's ochtends op de dag van het onderzoek in. De capsules zitten in een envelop bij de folder.

Medicijnen

U kunt u medicijnen op de normale manier en tijd innemen. Bepaalde medicijnen zijn echter van invloed op het onderzoek en moeten tijdelijk worden gestaakt. **Dit mag alleen in overleg met uw behandelend arts.**

Commerciële naam	Staken	Generieke (eigenlijke) naam	Staken
Amitriptyline	21 dg	Adalat	14 dg
Amlodipine	14 dg	Airomir	14 dg
Amoxapine	21 dg	Alprazolam	21 dg
Amphetamine	14 dg	Amlodipine	14 dg
Captopril	14 dg	Berotec	14 dg
Chlorpromazine	28 dg	Berotek	14 dg
Dopamine	14 dg	Bricanyl	14 dg
Doxepine	21 dg	Captopril	14 dg
Droperidol	28 dg	Cardene	14 dg

Enalapril	14 dg	Dehydrobenzperidol	28 dg
Haloperidol	28 dg	Depryl 25	28 dg
Imipramine	21 dg	Dynatra	14 dg
Isoproterenol	14 dg	Fargan	28 dg
Labetalol	21 dg	Fenoterol	14 dg
Loxapine	21 dg	Haldol	28 dg
Maprotiline	28 dg	Hydrobromide	14 dg
Metoprolol	14 dg	Hydrochloride	14 dg
Nicardipine	14 dg	Imipramine	21 dg
Nifedipine	14 dg	Isuprel	14 dg
Phenilephrine	14 dg	Largactil	28 dg
Phenoterol	14 dg	Lopresor	14 dg
Phenylpropanolamine	14 dg	Loxitane	21 dg
Promethazine	28 dg	Loxitane C	21 dg
Reserpine	14 dg	Maprotiline	28 dg
Salbutamol	14 dg	Metoprolol	14 dg
Terbutaline	14 dg	Nifedipine	14 dg
Tramadol	21 dg	Novasc	14 dg
Trazolone	28 dg	Partusisten	14 dg
		Phenergan	28 dg
		Phenilephrine	14 dg
		Phenoterol	14 dg
		Phenylpropanolamine	14 dg
		Promethazine	28 dg
		Promethegan	28 dg
		Prothiazine	28 dg
		Renitec	14 dg
		Reserpine	14 dg
		Salbutamol	14 dg
		Sarotex	21 dg
		Selokeen	14 dg
		Sinequan	21 dg
		Tazodac,	28 dg
		Thorazine	28 dg
		Tradonal	21 dg
		Tramadol	21 dg
		Tramagetic	21 dg
		Tramal	21 dg
		Trandate	21 dg
		Traze,	28 dg
		Trazodep	28 dg

		Trazolon	28 dg
		Trazonil	28 dg
		Trittico	28 dg
		Tryptizol	21 dg
		Ventolin	14 dg
		Xanax	21 dg

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig, als u kleding aan heeft waarin u zich goed kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Draag geen kleding met metalen knopen en ritsen. Deze kunnen de opnamen verstoren. Sieraden moet u afdoen.

Handicap

Als u een handicap heeft en u verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd vraagt, verzoeken wij u dit te melden bij het maken van de afspraak. Wij kunnen dan extra tijd voor u inplannen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan contact op met uw behandelend arts. Uw arts kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan of uitgesteld kan worden. Geeft u borstvoeding, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Dit gebeurt door middel van een injectie in een bloedvat in de arm. Het duurt enige tijd voordat de radioactieve stof goed in de organen is opgenomen. Daarom worden pas 24 uur na de toediening de eerste opnamen gemaakt.

Als er opnamen van uw buik gemaakt gaan worden, moet u laxeren. De medicijnen hiervoor krijgt u na de injectie mee. Het is niet nodig dat de darmen 'leeg' zijn, maar wel dat u vaak ontlasting produceert. U kunt eten zoals u gewend bent. Omdat de ontlasting meer wordt dan normaal en veel water bevat, moet u meer drinken dan u gewend bent. Drink twee en een halve liter per dag.

Tijdens het onderzoek neemt u de medicijnen om te laxeren als volgt in:

- de dag van de injectie en de dag erna voor het slapen gaan twee tabletten Bisacodyl.
- bij elke maaltijd een zakje Importal oplossen in een glas water of sap)



De volgende dag, tijdens het maken van de opnamen, ligt u op een onderzoekstafel met boven en onder u een camera. Deze camera maakt opnamen van het lichaam. Aanvullend wordt er een cirkel gedraaid rond een gedeelte van uw lichaam. Voor de kwaliteit van de opnamen is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. De tweede dag na de injectie worden weer opnamen van uw lichaam gemaakt.

Duur van het onderzoek

Op de dag van injectie duurt het ongeveer een kwartier. De opnamen de dag erna duren ongeveer twee uur. De opname op tweede dag duurt ongeveer een kwartier.

Bijwerkingen

Tijdens en na het inspuiten van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten. De kleine hoeveelheid straling waaraan u wordt blootgesteld is gering en levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. Neem geen kinderen jonger dan twaalf jaar mee naar het onderzoek.

Uitslag

Op een later tijdstip beoordeelt de nucleair geneeskundige de resultaten. Hij/zij maakt een verslag voor de behandelend arts. Meestal duurt dit ongeveer vijf werkdagen. Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag en de verdere behandeling.

Afzeggen afspraak?

Als u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Nucleaire geneeskunde via onderstaand telefoonnummer. Een andere patiënt kan dan worden ingepland, zodat de onderzoekstijd niet verloren gaat. Als u het onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde afzegt, neem dan ook contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, 088 125 52 91.

Locatie

Nucleaire geneeskunde (route 15)
Adrz, 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

Uw afspraak in Goes

Datum injectie: _____ dag _____ om _____ uur

Datum foto: _____ dag _____ om _____ uur

Datum tweede foto(s) : _____ dag _____ om _____ uur