

Emla[®] of Rapydan[®] aanbrengen bij kinderen

Deze folder geeft u informatie over Emla[®] of Rapydan[®] aanbrengen bij kinderen. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

Wat is EMLA[®]?

EMLA[®] is een geneesmiddel dat lokaal wordt aangebracht op de huid om de huid plaatselijk te verdoven. Deze zelf wordt gebruikt als verdoving, bijvoorbeeld bij bloedafname of infuus plaatsen. Op die manier zorgen we ervoor dat:

- uw kind op het moment minder voelt van de behandeling
- uw kind minder angstig zal zijn bij een eventuele volgende behandeling

EMLA[®] is verkrijgbaar in een tube van 5 mg of in kant-en-klare vorm, namelijk een pleister waar al EMLA[®] op aangebracht werd.

In sommige gevallen krijgt u geen EMLA[®] maar Rapydan[®], hiervan is de werking nagenoeg hetzelfde, alleen de inwerkijd van Rapydan[®] is korter, namelijk 30 minuten. Rapydan[®] is alleen beschikbaar in een kant en klare pleister.

Wanneer EMLA[®] aanbrengen?

- Voor een optimale werking moet EMLA[®] minimaal een uur (liever langer en maximaal 5 uur) vóór het onderzoek aangebracht worden. Houd hier rekening mee.
- EMLA[®] blijft gedurende verschillende uren actief. Ook na het verwijderen blijft de huid nog één tot twee uur verdoofd.
- EMLA[®] mag niet langer dan vier uur op de huid blijven. Bij baby's tot drie maanden mag de crème één uur op de huid blijven.

Mogelijke bijwerkingen

Een lichte reactie zoals bleekheid, roodheid, zwelling en jeuk kan zich voordoen op de plaats waar EMLA[®] werd aangebracht. Deze reacties zijn gewoonlijk licht en verdwijnen ongeveer tien minuten na het verwijderen.

Opmerkingen

- Bewaar EMLA[®] tussen 15°C en 25°C, niet in de koelkast of diepvries.
- EMLA[®] mag enkel op een intacte huid worden aangebracht. Licht vooraf de arts in als uw kind eczeem heeft.
- Vanaf de leeftijd van drie maanden mag er op twee plaatsen tegelijk EMLA[®] geplakt worden (bijvoorbeeld elleboogplooï en handrug).

Hoe EMLA-crème aanbrengen?

- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
- Breng EMLA[®]-crème aan op de handrug/in de elleboogplooï.
- De crème niet inwrijven of uitspreiden.
- Verwijder het centrale deel van de pleister en dek de crème af met de pleister. Let erop dat de pleister de crème goed bedekt.
- Verwijder de papieren rand en druk de randen aan.

Emla® of Rapydan® aanbrengen bij kinderen

- Onthoud het tijdstip van aanbrengen.



Hoe EMLA®-pleister/Rapydan® aanbrengen?

- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is.
- Verwijder de beschermlaag en zorg dat het midden van de pleister op de te verdoven plaats komt.
- Druk de randen stevig aan.
- Onthoud het tijdstip van aanbrengen.



Waar EMLA® of Rapydan® aanbrengen?

De arts of verpleegkundige zal u vertellen waar u EMLA® of Rapydan® moet aanbrengen:

Handrug en/of elleboogplooï:

- handrug: links rechts
- elleboogplooï: links rechts

Andere plaats op het lichaam:

- namelijk

Emla® of Rapydan® aanbrengen bij kinderen

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op:

- [Youtube.com/watch?v=uXQc88m4mrs](https://www.youtube.com/watch?v=uXQc88m4mrs)
- [Zol.be/sites/default/files/brochures/br0747-nl.pdf](https://zol.be/sites/default/files/brochures/br0747-nl.pdf)