

Scleroseren cyste

op de Radiologie

Deze folder geeft u informatie over de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van het scleroseren van een cyste. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor het scleroseren van een cyste op de afdeling Radiologie van Adrz. Uw behandelend arts heeft met u het doel van het scleroseren van een cyste besproken.

Wat is het scleroseren van een cyste?

Een cyste is een holte gevuld met vocht. Soms kan deze cyste zo groot zijn, dat deze klachten geeft. Vaak gaat het dan om een cyste in bijvoorbeeld de lever of de nier.

Deze cyste kunnen we dan behandelen door middel van het inspuiten van alcohol waardoor de cyste zal verschrompelen. De behandeling wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie door een radioloog met assistentie van een radiologisch laborant.

Melden bij behandelend arts en afdeling Radiologie

Het is belangrijk dat u ruim voordat de behandeling plaatsvindt, contact opneemt met uw behandeld arts en de afdeling Radiologie als u:

- een antistollingsmiddel (bloedverdunner) gebruikt, zoals sintrom, marcoumar, xarelto, pradaxa, clopidogrel
- last heeft van allergieën
- zwanger bent of mogelijk zwanger bent

Vorbereiding ingreep

Eten en drinken

Bij het scleroseren van een cyste dient u twee uur voorafgaand aan de behandeling nuchter te zijn. Dit wil zeggen niet eten, drinken en/of roken. Ook mag u op de dag van de behandeling geen vette, zwaar verteerbare maaltijden gebruiken.

Medicatie

Uw medicijnen kunt u op de normale manier en op de normale tijdstippen innemen, tenzij anders met u is afgesproken. Overleg als u twijfelt over het innemen van medicijnen met uw behandelend arts. Het gebruik van medicatie met betrekking tot antistolling/bloedverdunding dient afgestemd te worden met uw behandeld arts. Deze medicatie moet mogelijk tijdelijk gestopt worden.

Opname

Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Dit betreft een dagopname. Dit is noodzakelijk voor een juiste voorbereiding en nazorg van de behandeling. Indien u nog niet bent opgenomen ontvangt u hierover bericht van het Opnameplein.

Kleding

Trek kleding aan waarin u zich goed kunt bewegen en die u makkelijk uit en aan kunt trekken. Laat uw sieraden en waardevolle spullen thuis.

Scleroseren cyste

Vorbereiding op verpleegafdeling

De verdere voorbereidingen voor de behandeling worden met u besproken door een verpleegkundige van de afdeling.

Verloop behandeling

De verpleegkundige brengt u naar de afdeling Radiologie. Voordat de behandeling begint, legt de medewerker van de Radiologie u uit wat er gaat gebeuren. Uiteraard kunt u altijd vragen stellen als u iets niet begrijpt.

De behandeling wordt uitgevoerd door de radioloog, de laborant of doktersassistent assisteert hem hierbij.

Tijdens de behandeling ligt u in verschillende posities. Meestal ligt op uw rug of half op uw zij, een enkele keer op uw buik. Tijdens de behandeling is het van belang dat u goed stilligt. Vervolgens bepaalt de radioloog met echografie waar er geprikt zal worden.

Hierna wordt de huid gedesinfecteerd en komt u onder steriele doeken te liggen. Ook krijgt u een plaatselijke verdoving. Met behulp van de echo wordt de plaats van de cyste aangeprikt. Als de naaldpunt zich op de juiste plaats bevindt, wordt een draad en vervolgens een drain geplaatst. Daarna wordt de drain zorgvuldig vastgeplakt.

Het vocht uit de cyste wordt via de drain verwijderd. Als de cyste leeg is, worden er opnames gemaakt met contrastvloeistof om te kijken of er geen verbinding aanwezig is tussen de cyste en andere organen. Als dit niet het geval is, dan wordt de alcohol ingebracht.

Hierna wordt u teruggebracht naar de afdeling, waar u instructies krijgt van de verpleegkundige om gedurende 2 uur elke 5 á 10 minuten te wisselen van ligging (buikligging, rugligging enzovoorts). Na maximaal 2 uur komt u terug op de afdeling Radiologie om de alcohol en de drain te verwijderen.

Duur van de behandeling

- Het eerste deel van de behandeling (inbrengen drain en alcohol) duurt ongeveer dertig minuten.
- Hierna verblijft u maximaal 2 uur op de verpleegafdeling.
- Het verwijderen van de alcohol en de drain duurt ongeveer 15 minuten.
- Na de behandeling verblijft u ter controle nog ongeveer 2 uur op de verpleegafdeling voor u naar huis mag.

Na de behandeling

Na de behandeling haalt de verpleegkundige van de afdeling u op en brengt u terug naar de afdeling. Op de afdeling vinden diverse lichamelijke controles plaats. Ook krijgt u bedrust. Hierover wordt u nader ingelicht door de verpleegkundige van de afdeling.

Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen. Bij een ongeval bent u mogelijk niet verzekerd. Vermijd de rest van de dag en de volgende dag zwaar lichamelijke inspanning.

Uw behandelend arts is verantwoordelijk voor het vervolgtraject.

Mogelijke complicaties

Geen enkel onderzoek/geen enkele behandeling is zonder risico's. Ernstige complicaties doen zich zelden voor. Complicaties worden door de aanvragend arts en radioloog met u besproken.

Scleroseren cyste

Contact opnemen na onderzoek

Neemt u contact op met uw behandelend arts of huisarts als:

- het wondje waar de drain heeft gezeten er rood uitziet en pijnlijk aanvoelt
- u koorts heeft of hevige pijn krijgt

Uitslag

Indien nodig wordt er een vervolgspraak voor u bij uw behandelend arts gepland.

Verhinderd

Kunt u niet naar de behandeling komen, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor het onderzoek bij het Opnameplein via telefoonnummer 088 338 84 44. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 125 43 60.