

Allergie huidtest bij kinderen

Deze folder geeft u informatie over een allergie huidtest bij kinderen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De kinderarts heeft met u en uw kind een afspraak gemaakt voor het afnemen van een huidtest bij uw kind. Met deze huidtest kunnen we een overgevoeligheid (allergie) vaststellen. We kunnen deze test soms combineren met een bloedtest.

Vorbereiding onderzoek

Als voorbereiding op het onderzoek moet uw kind een week voor het onderzoek stoppen met antihistaminica.

Uitvoeren huidtest

Bij het afnemen van de test, druppelt de kinderarts wat vloeistoffen op de huid van uw kind. Dit is meestal de huid van de binnenzijde van de linker- of rechteronderarm. Na het aanbrengen van de vloeistoffen, brengt de arts deze met een naaldje in in de huid. Uw kind krijgt dus een aantal prikjes op beide onderarmen – tot 5 prikjes per arm. Ieder prikje bevat een andere soort vloeistof om allergie voor een bepaalde stof te kunnen meten.

Na 15-20 minuten kan de arts de reactie van de huid zien. Wanneer de huid rood is en rond het insteekgaatje een zwelling is ontstaan, is uw kind gevoelig voor het ingebrachte allergeen. Let op: dit is niet hetzelfde als het hebben van een allergie, maar de reactie van de huid kan wel passen bij een allergie.

Meest voorkomende allergieën bij huidtest

Met een huidtest kunnen we verschillende allergieën aantonen. Sommige allergieën kunnen we zelfs eerder aantonen via de huid dan via het bloed. Dit zijn de meest voorkomende allergieën die we kunnen aantonen via de huid:

- Allergie voor penicilline: wanneer mogelijk sprake is van een allergische reactie op penicilline, doen we de volgende onderzoeken:
 - bloedonderzoek op antistoffen
 - huidtest zoals boven beschreven
- Allergie voor voedsel: om een voedselallergie vast te stellen, brengt de kinderarts bijvoorbeeld een druppel koemelk, sojamelk, eiwit of eigeel aan op de huid van uw kind. Geeft de huid een reactie? Dan moet het dieet van uw kind in ieder geval tijdelijk worden aangepast en krijgt u een verwijzing voor de diëtiste.
- Allergie van de luchtwegen of bij eczeem: alle kinderen met luchtwegklachten of eczeem bij wie we het vermoeden hebben van een allergie, controleren we op overgevoeligheid voor bepaalde (huis)dieren, huisstof, grassen, bomen of schimmels.

Bij bijvoorbeeld een huisstofallergie kan de longverpleegkundige een keer bij u langskomen om u te adviseren. De kinderarts kan hiervoor een verwijzing regelen.

Contact bij vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde:

- Goes: 088 125 42 14
- Vlissingen: 088 125 55 27