

Nitroglycerine

In overleg met uw specialist heeft u een medicijn gekregen dat u kunt gebruiken bij specifieke angina pectoris klachten. In deze folder krijgt u informatie over het gebruik van het medicijn Nitroglycerine. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Angina pectoris (hartkramp) kan zich op verschillende manieren presenteren:

- Druk of pijn op de borst
- Benauwdheid
- Pijn in de linkerarm
- Pijn tussen de schouderbladen
- Pijn aan de kaken
- Transpireren

Een oorzaak van deze klachten kan een vernauwing in de kransslagaders zijn. Hierdoor worden niet alle delen van het hart even goed van bloed voorzien.

Hoe werkt Nitroglycerine?

Nitroglycerine is een bloedvat verwijdend medicijn. Na gebruik verwijden alle bloedvaten waardoor het bloed makkelijker doorstroomt. Het hart hoeft dan minder hard te werken. De kans is groot dat uw klachten dan snel verdwijnen.

Bijwerkingen van Nitroglycerine

Bij het gebruik van Nitroglycerine kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Kloppend gevoel in het hoofd
- Hoofdpijn
- Lage bloeddruk
- Duizeligheid

Over het algemeen verdwijnen deze klachten binnen 15 minuten.

Gebruik en houdbaarheid van Nitroglycerine

Uw behandelend arts kan het medicijn Nitroglycerine in twee vormen voorschrijven:

1. Als Nitrospray: deze spray spuit u direct onder de tong.
2. Als tablet Isordil: het tablet Isordil laat u onder de tong smelten.

Zowel de spray als het tablet kan een prikkelend of tintelend gevoel in de mond geven. Let ook goed op de houdbaarheid van de Nitroglycerine. Als de datum verstreken is, werkt het medicijn niet meer.

Wanneer en hoe gebruikt u de Nitroglycerine?

Krijgt u angina pectoris klachten? Stop dan met uw activiteiten en ga zitten of liggen. Neemt de pijn dan binnen vijf minuten niet duidelijk af en verdwijnt de pijn niet binnen tien minuten? Neem dan de Nitroglycerine in zoals hieronder beschreven:

1. Gebruik de spray alleen als u zit of ligt. Dit vanwege de kans op bloeddrukdaling, waarbij u klachten van duizeligheid kan/kunt krijgen. Rijdt geen auto zolang u duizelig bent of angina pectoris klachten heeft.
2. Bij gebruik van een nieuw flesje of wanneer de spray gedurende langere tijd niet is gebruikt, de eerste paar doses in de lucht sproeien tot er vloeistof uitkomt.

Nitroglycerine

3. Houd de opening zo dicht mogelijk bij de mond, spray 1 keer onder de tong. Tijdens toediening de adem inhouden en mond dichthouden om te voorkomen dat de spray wordt ingeademd of vervliegt.
4. Na het gebruik van de Nitroglycerine moet de pijn binnen 10 minuten zijn verdwenen. Verdwijnt de pijn niet? Dan mag u nog één keer de Nitroglycerine gebruiken. De pijn moet dan binnen 10 minuten helemaal weg zijn.

Verdwijnt de pijn dan nog niet? Bel dan altijd de huisarts of het alarmnummer 112.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Cardiologie:

Goes: 0113 234 480

Vlissingen: 0118 425 325