

Ijzerinfuus tegen bloedarmoede

Deze folder geeft u informatie over een ijzerinfuus tegen bloedarmoede. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Ijzerinfuus tegen bloedarmoede

Bloedarmoede kan de volgende klachten geven: moeheid, kortademigheid bij inspanning en duizeligheid. Een ijzerinfuus kan ervoor zorgen dat de bloedarmoede afneemt.

Het ijzerinfuus wordt in het ziekenhuis toegediend. Hiervoor wordt u een aantal uren opgenomen in het ziekenhuis te Goes. Als u het ijzerinfuus voor het eerst krijgt toegediend is het niet mogelijk om dit in Vlissingen te krijgen. Na het infuus mag u weer naar huis. U mag zelf autorijden, mits u zich goed voelt.

Mogelijke bijwerkingen

Het infuus kan bijwerkingen geven zoals: hoofdpijn, metaalsmaak in de mond, duizeligheid, buikpijn, verstopping, diarree, roodheid van de huid op de plaats waar het infuus heeft gezeten en misselijkheid. In hele zeldzame gevallen (0.01-0.1 % kans) kan er een ernstige allergische reactie optreden. De klachten gaan doorgaans vanzelf weer over. Mocht u zich zorgen maken, meldt dit dan bij uw verpleegkundige op de afdeling waar het infuus wordt toegediend. Als u al medicijnen gebruikt voor bloedarmoede kunt u deze stoppen.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.