

# Blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker

**Deze folder geeft u informatie over blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.**

Therapie met blaasspoeling is een behandeling waarbij een cytostatica direct in de blaas wordt gebracht. Deze therapie wordt gebruikt voor behandeling en ter voorkoming van oppervlakkige blaastumoren of blaaspoliepen.

## Mitomycine

Mitomycine is een medicijn, dat de celdeling van tumorcellen remt (chemotherapie). Tumorcellen onderscheiden zich van de normale cellen doordat ze zich ongeremd delen. Mitomycine grijpt in waardoor de celdeling wordt geremd en uiteindelijk afsterft.

## Vorbereiding

- U mag vier uur vóór de blaasspoeling en tijdens het ophouden van de spoeling niet drinken. Als u drinkt loopt de blaas sneller vol waardoor u sneller moet plassen. Tevens wordt het medicijn dan vermengd met urine waardoor het minder werkzaam is.
- Gebruikt u plastabletten, neem deze niet in vóór de spoeling, maar na het uitplassen van de spoeling.
- Een uur vooraf niet uitplassen.
- Laat aan de verpleegkundige of Uroloog weten of u zich koortsig heeft gevoeld, ongewoon moe bent geweest of bloed of bloedstolsels in uw urine heeft gezien na de laatste behandeling.

## De behandeling

Tijdens de behandeling hoeft alleen de onderkleding naar beneden, niet uit. U ligt op een onderzoekstafel. De verpleegkundige reinigt de omgeving van de plasbuis en brengt een katheter via de plasbuis in de blaas waarmee de verpleegkundige de blaas eerst helemaal leeg laat lopen. Vervolgens wordt de Mitomycine via de katheter in de blaas ingebracht. De katheter wordt na het inbrengen van de Mitomycine verwijderd. Hierna gaat u naar huis. Het is de bedoeling dat de oplossing gedurende twee uur in de blaas blijft.

## Na de behandeling

- Ga direct na de behandeling naar huis; gebruik geen toilet in het ziekenhuis.
- De eerste 48 uur na de spoeling plast u zittend. Bij mannen moet tijdens het plassen de voorhuid teruggeschoven worden. Zorg dat u na toiletgebruik uw handen en geslachtsdeel zorgvuldig wast.
- Toilet tweemaal doorspoelen met deksel naar beneden.
- Maak dagelijks het toilet schoon met PH-neutrale zeep.
- Zorg dat u de eerste uren nadat de spoeling eruit is voldoende drinkt om uw blaas schoon te spoelen. Extra drinken vermindert het branderige gevoel.
- Het is belangrijk dat u bij een volgend bezoek aangeeft of u:
  - \* na de behandeling misselijk blijft
  - \* dikwijls moet plassen
  - \* rode vlekken op uw handen, voeten en rondom uw geslachtsdeel heeft
- Heeft u problemen met plassen, bijvoorbeeld helderrood of pijnlijk plassen of een snijdende pijn in de blaas,

## Blaasspoeling met cytostatica bij blaaskanker

neem dan direct contact op met de polikliniek Urologie.

- Geslachtsgemeenschap: De eerste 48 uur een condoom gebruiken.
- Heeft u last van urineverlies, gebruik dan speciale inleggers voor urine-incontinentie. Gooi deze de eerste 48 uur weg in een dubbele vuilniszak.

### **Na de behandeling met verblijfskatheter**

- Spoelvloeistof wordt door de katheter ingebracht en wordt gedurende twee uur afgeklemd.
- Na twee uur verwijdert u de klem en laat de vloeistof aflopen in de katheterzak. Vervang vervolgens de zak (ongeveer na vijftien minuten).
- De eerste 48 uur doet u volle urinezakken in een dubbele vuilniszak in de huisafval container (niet legen in het toilet).

### **Tot slot**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze gerust aan uw behandelend arts.

### **Afspraak**

Wilt u een afspraak maken, annuleren of verzetten neem dan contact op met de Afspraakcentrale via de receptie van het ziekenhuis (088 125 00 00).