

Perifeer Ingebrachte Centraal Catheter lijn (PICC-lijn)

Deze folder geeft u informatie over een Perifeer Ingebrachte Centraal Catheter lijn (PICC-lijn). Het is goed u te realiseren dat de situatie anders kan zijn dan beschreven. Uw arts heeft voorgesteld om bij u een PICC-lijn te plaatsen vanwege een langdurige infuusbehandeling.

Wat is een PICC-lijn?

PICC is de afkorting van Perifeer Ingebrachte Centraal Catheter. Een PICC-lijn is een dun slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC-lijn komt in de grote holle ader in de borstkas en ligt dan net boven het hart.

Waarom een PICC-lijn?

De PICC-lijn heeft als voordeel dat er op een veilige, niet pijnlijke manier medicijnen of voeding rechtstreeks in de grote bloedvaten toegediend kunnen worden. De PICC-lijn kan tot een jaar ter plaatse blijven, maar als deze niet meer gebruikt wordt moet de PICC-lijn verwijderd worden.

Hoe wordt een PICC-lijn ingebracht?

Het inbrengen van de PICC-lijn vindt plaats door de physician assistant (PA) op de poliklinische operatiekamer (PKOK) in Goes. Het plaatsen neemt in totaal ongeveer een half uur in beslag onder steriele omstandigheden. De medewerker die de PICC-lijn inbrengt, draagt daarom een operatieschort, masker en steriele handschoenen.

Hoe gaat het plaatsen van de PICC-lijn?

De PICC-lijn wordt geplaatst met behulp van een echo in de bovenarm terwijl u op uw rug ligt. De echo wordt gebruikt om het bloedvat te vinden en aan te prikken. Vervolgens wordt er in het bloedvat een zogenaamde voerdraad geplaatst. Over de voerdraad wordt de definitieve PICC-lijn opgeschoven tot boven het hart onder ECG-geleiding.

Waar meldt u zich?

U meldt zich aan bij de aanmeldzuilen bij de ingang van Adrz. Vervolgens volgt u route 19. Wanneer u opgenomen bent, begeleidt een verpleegkundige van de afdeling u.

Verzorging van de PICC-lijn

Een klein gedeelte van de PICC-lijn is buiten het lichaam zichtbaar. De PICC-lijn wordt niet vastgehecht, maar met een speciale fixatiepleister op zijn plaats gehouden. De fixatiepleister wordt eens per drie weken verwisseld. De insteekopening van de PICC-lijn wordt afgedekt met Tegaderm®. Dit is een steriel doorzichtige folie. Deze folie voorkomt dat bacteriën via de PICC-lijn het lichaam in kunnen gaan. De Tegaderm® pleister wordt wekelijks verschoond. Elke keer na gebruik moet de PICC-lijn worden doorgespoten met een zoutoplossing (NaCl 0,9%). Ook als de PICC-lijn even niet in gebruik is, moet deze wekelijks worden doorgespoten. Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, verzorgt de verpleegkundige de PICC-lijn. Thuis neemt de thuiszorg deze zorg over. Zij komen dan wekelijks bij u langs. Indien u binnen de oncologie de lijn gebruikt, gaan de middelen voor de lijn en de verzorging via de dagbehandeling oncologie.

Aandachtspunten

U mag douchen, maar de fixatiepleisters en de Tegaderm® pleisters moet u laten zitten om loslaten en/of infectie van de PICC-lijn te voorkomen. Wel moet u PICC-lijn volledig afschermen van water door een beschermhoes of doorzichtig huishoudfolie waarmee u uw bovenarm met PICC-lijn omwikkelt. Laat geen bloed afnemen uit de arm waarin de PICC-lijn zit, wel uit de PICC-lijn zelf. Dit mag alléén een verpleegkundige op de verpleegafdeling of dagbehandeling doen, hierdoor kan er geen bloedafname gedaan worden op het laboratorium. Meet bij voorkeur niet de bloeddruk aan de arm waarin de PICC-lijn zit.

Mogelijke complicaties:

- Lijninfectie
- Trombosearm
- Nabloeding
- Geïnfecteerde insteekopening
- Occlusie van de lijn

Neem contact op met uw behandelaar bij:

- Vocht of pus dat uit de insteekopening komt
- Een rode insteekopening
- Een gezwollen/dikke insteekopening
- Lekkage bij de insteekopening
- Koorts > 38.5 °C
- Kortademigheid
- Pijn op de borst
- Problemen met doorspuiten

Bereikbaar

Bij vragen of complicaties kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Bij spoedgevallen neemt u contact op met het algemene nummer van het ziekenhuis in Goes, 088 125 00 00.