

MRSA-kweekinstructie

Deze folder geeft u informatie over hoe u zelf een kweek kunt afnemen om te zien of u de MRSA-bacterie bij u draagt. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan beschreven.

U heeft verschillende materialen ontvangen om de kweek af te nemen. Lees het stappenplan eerst helemaal door, voordat u begint.

Belangrijk

In de volgende gevallen is kweken nu mogelijk niet zinvol. Neem contact op met de afdeling Infectiepreventie als u:

- Een wond heeft
- Huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem) heeft
- Een blaaskatheter heeft
- Fluïmen (sputum) ophoest
- Antibiotica gebruikt of de laatste 48 uur heeft gebruikt

MRSA

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor veel soorten antibiotica en daardoor moeilijk te bestrijden. MRSA kan voornamelijk infecties veroorzaken bij patiënten met een verminderde weerstand.


Kweek afnemen

De benodigheden

1. Drie steriele verpakkingen met daarin een wattenstokje en een buisje (afbeelding 1)
2. Stickers met uw patiëntgegevens, inclusief vermelding: 'keel', 'neus' en 'perineum'.
3. Aanvraagformulier MRSA van MMI (afbeelding 2)
4. Safetybag met wit absorberend vel (afbeelding 3)
5. Retourenvelop (afbeelding 4)



Afbeelding 1




Afbeelding 2

MRSA-kweekinstructie



Afbeelding 3



Afbeelding 4


Stappenplan

Neuskweek

1. Vul de datum van afname in op het aanvraagformulier MRSA van MMI.
2. Het afnamesysteem bevat een buisje met vloeistof en een wattenstokje.
3. Maak de steriele verpakking open aan de bovenkant.




4. Neem een neuskweek af: steek het watje in de neus en strijk een aantal keren langs de neusvleugel en in het puntje van de neus.



5. Doe vervolgens hetzelfde bij het andere neusgat met hetzelfde watje.
6. Haal de roze dop van het buisje met de vloeistof en zorg dat de vloeistof er niet uit loopt.

MRSA-kweekinstructie


7. Stop de wattenstok in de vloeistof en breek de stok af op het aangegeven streepje:



8. Schroef de roze dop terug op het buisje waardoor het wattenstokje in het buisje wordt vastgeklemd.
9. Controleer of het buisje goed dicht is gedraaid en niet lekt.
10. Plak de patiëntsticker met uw gegevens en opschrift 'neus' op het buisje.

Keelkweek


1. Open daartoe een nieuw wattenstokje en strijk hiermee langs de linker en rechter tonsilboog heen en terug.



2. Haal de roze dop van het buisje met de vloeistof en zorg dat de vloeistof er niet uit loopt.
3. Stop de wattenstok in de vloeistof en breek de stok af op het aangegeven streepje.
4. Plak de sticker met uw gegevens en opschrift 'keel' op het buisje.

Perineumkweek

1. Open daartoe een nieuw wattenstokje en strijk hiermee met een ronddraaiende beweging langs de huid tussen de anus (het poepgat) en de uitwendige geslachtsorganen.



2. Haal de roze dop van het buisje met de vloeistof en zorg dat de vloeistof er niet uit loopt.
3. Stop de wattenstok in de vloeistof en breek de stok af op het aangegeven streepje.
4. Plak de sticker met uw gegevens en opschrift 'perineum' op het buisje.

Overige kweekplaatsen, indien aanwezig

- Insteekopeningen van drains: Bestrijk met de eSwab het gebied rondom de insteekplaats.
- Wonden en huidafwijkingen: Strijk met de eSwab zoveel mogelijk langs een vochtig gedeelte van de wond.
- Urinekweek: Was de omgeving van de urinebuis met stromend water. Vang een 'mid-stream'-portie urine (middelste gedeelte) op in een steriel kweekpotje. Bij urinekatheter: neem bij katheter via het afnamepunt op de katheterslang urine af in een steriel potje.
- Sputum: Vang sputum op in een steriele kweekpot.

Inpakken

Wikkel de drie buisjes met de wattenstokjes in het witte absorberende vel en stop ze dan in het bijgeleverde plastic zakje (safetybag, zie afbeelding 4 'benodigdheden').

Versturen

De snelste methode is om de retourenvelop af te geven bij de afdeling Bloedafname op alle locaties van Adrz. Ook kunt u de retourenvelop op de post doen, een postzegel is niet nodig.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is na minimaal drie werkdagen bekend. De specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag en neemt hierover alleen contact met u op indien de uitslag daartoe aanleiding geeft (indien u MRSA blijkt te hebben) en anders hoort u verder niets meer.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Infectiepreventie via (088) 125 44 50.

Folder in een andere taal

[Arabisch \(العربية\)](#)

[Duits \(Deutsch\)](#)

[Engels \(English\)](#)

[Pools \(Polski\)](#)

